

Texto de rotulagem

Magmax
hidróxido de magnésio 80 mg/mL

Leite de magnésia

USO ORAL
USO ADULTO

AGITE BEM ANTES DE USAR
TRADICIONAL

Suspensão oral

Conteúdo 100 mL

Composição: cada 15 mL (1 colher de sopa) contém 1200 mg de hidróxido de magnésio $Mg(OH)_2$ e excipiente q.s.p. 15 mL.
Excipientes: sorbitol, metilparabeno, propilparabeno, sacarina sódica, álcool etílico, goma xantana, aroma de hortelã e água purificada).

Modo de usar: uso interno. Como antiácido: 5 a 15 mL (1 colher de chá a uma 1 colher de sopa), duas vezes ao dia. Como laxante: 30 a 60 mL (2 a 4 colheres de sopa).

Indicações: antiácido e laxante suave.

Precauções e advertências: agite antes de usar. Precauções: não ingerir na gravidez ou se estiver amamentando sem orientação médica. No caso de superdosagem, procure orientação médica. Precauções como laxativo: não usar em presença de dor abdominal, náuseas, vômitos, alterações nos hábitos intestinais por mais de 2 semanas, sangramento retal e doença renal. Precauções como antiácido: pode haver efeito laxativo.

Cuidados de conservação: conservar em temperatura ambiente (15 a 30° C). Proteger do calor excessivo, da luz e umidade.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA 199/2006. AFE N°1.03841-3.
AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Natulab Laboratório S.A
Rua H Nº 02, Galpão III - Urbis II
Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.574-150
CNPJ 02.456.955/0001-83
Responsável Técnico: Tales de Vasconcelos Cortes
CRF/BA 3745
Indústria Brasileira

Assinatura do SAC
0800 730 7370
www.natulab.com.br
Cód. barras 7899470802275