

Sanprost

Serenoa repens (Arecaceae), frutos, saw palmetto

MEDICAMENTO FITOTERÁPICO

FORMA FARMACÊUTICA

Cápsula gelatinosa mole – 320 mg/cápsula
Embalagem com 1 blister contendo 8 cápsulas moles.
Embalagem com 1 blister contendo 15 cápsulas moles.
Embalagem com 2 blisters contendo 30 cápsulas moles.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada cápsula gelatinosa mole contém:
Extrato oleoso de *Serenoa repens**....320,0mg
Excipiente q.s.p.....1 cápsula
* Equivalente a 288mg de ácidos graxos.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

Este medicamento é destinado ao Tratamento de Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP) e dos sintomas associados.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Este medicamento atua na redução do crescimento do número de células da próstata. Essa propriedade resulta da inibição da produção e ação do hormônio diidrotestosterona (DHT) no tecido prostático. A acumulação deste é fator importante para o crescimento e aumento do volume da próstata. Desta forma, este medicamento é utilizado no tratamento e alívio de sintomas da Hiperplasia Benigna da Próstata (HBP), tais como: diminuição da força do jato de urina, vontade constante de urinar, principalmente à noite, e sensação de esvaziamento incompleto da bexiga.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Pacientes com histórico de hipersensibilidade e alergia a qualquer um dos componentes da fórmula não devem fazer uso do medicamento.

Este medicamento é contraindicado para uso por crianças.

Este medicamento é contraindicado para uso por mulheres.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista (categoria de risco C).

Este medicamento não é indicado nos casos mais intensos de retenção urinária.

As infecções e/ou inflamações do trato urinário, além de outras desordens deste trato, podem apresentar sintomas semelhantes aos da HBP, sendo de grande importância para o paciente uma avaliação médica antes de utilizar este medicamento fitoterápico.

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Deverá ser feita consulta médica prévia, a fim de afastar a possibilidade de câncer de próstata.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista (categoria de risco C).

Medicamentos utilizados em terapia de reposição hormonal podem exigir reajustes de dose. O uso deste medicamento deve ser acompanhado por consultas médicas periódicas.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamentos sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Sanprost deve ser guardado à temperatura entre 15°C e 30°C, ao abrigo da luz e umidade. Nestas condições, o medicamento se manterá próprio para o consumo, respeitando o prazo de validade indicado na embalagem.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Cápsula gelatinosa mole, cor vinho opaco, formato oval.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? USO ORAL/USO INTERNO

Ingerir 1 cápsula, uma vez ao dia.

USO ADULTO.

As cápsulas devem ser ingeridas inteiras, com quantidade suficiente de água para que sejam deglutidas.

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

HEBRON



Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.
Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso haja esquecimento da ingestão de uma dose deste medicamento, retome a posologia prescrita sem a necessidade de suplementação.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Náusea, distúrbios estomacais, dor abdominal, prisão de ventre e diarreia. Em casos raros, pode ocorrer aumento da pressão arterial, diminuição do desejo sexual, impotência, retenção urinária e dor de cabeça.

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa por meio do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERS LEGAIS

MS 1.1557.0066.XXX-XX **Sanprost** 8 cápsulas
gelatinosas moles.

MS 1.1557.0066.001-0 **Sanprost** 15 cápsulas
gelatinosas moles.

MS 1.1557.0066. 002-9 **Sanprost** 30 cápsulas
gelatinosas moles.

Farm. Resp.: Marta Melissa Leite Maia
CRF/PE n° 2842

INFAN – INDÚSTRIA QUÍMICA
FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
 Rodovia BR-232 – km 136 – Bairro Agamenon
 Magalhães – Caruaru/PE
 CEP 55.034-640
 CNPJ 08.939.548/0001-03
 Indústria Brasileira

Todas as marcas nesta bula são propriedade do grupo de empresas Hebron.

www.hebron.com.br
sac@hebron.com.br
SAC: 0800 724 2022

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Esta bula foi aprovada pela ANVISA
em 08/11/2010.



RECICLÁVEL

HIEBRON

I·LEBRON

71065-02