

# **fosfato de sitagliptina**

**Sandoz do Brasil Ind. Farm. Ltda.**

**comprimidos revestidos**

**25mg, 50mg e 100mg**

**I) IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO****fosfato de sitagliptina**

Medicamento genérico, Lei nº 9.787, de 1999

**APRESENTAÇÕES**

**fosfato de sitagliptina** comprimidos revestidos 25 mg. Embalagem 30 comprimidos revestidos.

**fosfato de sitagliptina** comprimidos revestidos 50 mg. Embalagem 30 ou 60 comprimidos revestidos.

**fosfato de sitagliptina** comprimidos revestidos 100 mg. Embalagem 30 ou 60 comprimidos revestidos.

**USO ORAL****USO ADULTO****COMPOSIÇÃO****Cada comprimido revestido de 25 mg contém:**

fosfato de sitagliptina monoidratado..... 32,125 mg

(equivalente a 25 mg de sitagliptina)

Excipientes q.s.p. ....1 comprimido

(fosfato de cálcio dibásico, celulose microcristalina, croscarmellose sódica, hiprolose, dióxido de sílicio, estearato de magnésio, estearilfumarato de sódio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho, talco)

**Cada comprimido revestido 50 mg contém:**

fosfato de sitagliptina monoidratado..... 64,250 mg

(equivalente a 50 mg de sitagliptina)

Excipientes q.s.p. ....1 comprimido

(fosfato de cálcio dibásico, celulose microcristalina, croscarmellose sódica, hiprolose, dióxido de sílicio, estearato de magnésio, estearilfumarato de sódio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho, talco)

**Cada comprimido revestido 100 mg contém:**

fosfato de sitagliptina monoidratado..... 128,500 mg

(equivalente a 100 mg de sitagliptina)

Excipientes q.s.p. ....1 comprimido

(fosfato de cálcio dibásico, celulose microcristalina, croscarmellose sódica, hiprolose, dióxido de sílicio, estearato de magnésio, estearilfumarato de sódio, hipromelose, macrogol, dióxido de titânio, óxido de ferro amarelo, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro preto, talco)

**II) INFORMAÇÕES AO PACIENTE****1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Seu médico prescreveu SITAGLIPTINA para ajudar a reduzir seus níveis de açúcar no sangue, que estão aumentados por causa do diabetes tipo 2. SITAGLIPTINA pode ser utilizado isoladamente ou em combinação com alguns outros medicamentos que diminuem os níveis de açúcar no sangue e deverá ser associado à dieta e a um programa de exercícios que seu médico lhe recomendará.

**O que é diabetes tipo 2?**

Diabetes tipo 2 é um distúrbio no qual seu organismo não produz insulina em quantidade suficiente, e a insulina produzida não age tão bem como deveria. Seu organismo também pode produzir muito açúcar. Quando isto ocorre, o açúcar (glicose) no sangue aumenta e pode causar problemas graves de saúde.

O principal objetivo do tratamento do diabetes é normalizar os níveis de açúcar no sangue. A redução e o controle dos níveis de açúcar no sangue podem ajudar a prevenir ou retardar as complicações do diabetes, como doença cardíaca, doença renal, perda da visão e amputação de membros.

Como já foi mencionado, níveis altos de açúcar no sangue podem ser reduzidos por meio de dieta e exercícios e com o uso de alguns medicamentos.

**2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Sitagliptina pertence a uma classe de medicamentos denominados inibidores da DPP-4 (inibidores da dipeptidil

peptidase-4) que reduz os níveis de açúcar no sangue em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. O diabetes tipo 2 também é denominado diabetes não-insulino-dependente.

- sitagliptina ajuda a melhorar os níveis de insulina após as refeições.
- sitagliptina diminui a quantidade de açúcar produzida pelo organismo.
- sitagliptina age quando os níveis de açúcar no sangue estão altos, especialmente após uma refeição; sitagliptina também reduz os níveis de açúcar no sangue entre as refeições.
- É improvável que sitagliptina por si só cause níveis muito baixos de açúcar no sangue (hipoglicemia), porque ele não age quando os níveis de açúcar no sangue já estão baixos.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você **não** deve tomar sitagliptina se: for alérgico a qualquer um dos seus ingredientes (veja **COMPOSIÇÃO**).

### 4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

**Gravidez e amamentação:** mulheres grávidas ou que pretendem engravidar devem consultar seu médico antes de tomar sitagliptina. O uso de sitagliptina não é recomendado durante a gravidez.

Ainda não se sabe se sitagliptina passa para o leite materno, por isso você não deve usar sitagliptina se estiver amamentando ou se planeja amamentar.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Crianças:** Sitagliptina não é eficaz em crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade. Sitagliptina não foi estudado em crianças com menos de 10 anos de idade.

**Idosos:** nos estudos, sitagliptina demonstrou boa ação e foi bem tolerado por pacientes adultos mais idosos, por isso não é necessário ajuste de dose com base na idade.

**Precauções:** informe ao seu médico se você apresenta ou já apresentou:

- diabetes tipo 1;
- cetoacidose diabética (níveis elevados de cetonas no sangue ou na urina);
- problemas renais ou outros problemas clínicos;
- uma reação alérgica a sitagliptina.

#### Enquanto estiver tomando sitagliptina

Foram relatados casos de inflamação do pâncreas (pancreatite) em pacientes que usavam sitagliptina. A pancreatite pode ser uma doença grave, até fatal. Pare de tomar sitagliptina e entre em contato com seu médico se sentir dor estomacal forte e persistente, com ou sem vômitos, porque você pode estar com pancreatite.

Casos de reações na pele denominadas penfigoide bolhoso, que podem exigir tratamento hospitalar, foram relatados entre os pacientes tratados com sitagliptina. Caso você desenvolva bolhas ou ruptura (erosão) na pele, informe o seu médico. Ele poderá orientá-lo a parar de tomar sitagliptina.

**Dirigir veículos ou operar máquinas:** não existem informações sugestivas de que sitagliptina afete sua capacidade de dirigir veículos ou operar máquinas.

**Interações medicamentosas:** Sitagliptina pode ser tomado com a maioria dos medicamentos. Informe seu médico sobre todos os medicamentos que esteja tomando, inclusive aqueles obtidos com receita médica, de venda livre e suplementos fitoterápicos (medicamentos feitos a partir de vegetais).

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

### 5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Conservar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger da luz.

**Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.**

**Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### Aspecto físico:

- Sitagliptina 25 mg – comprimido revestido, rosa escuro, circular, biconvexo, com a inscrição “SN” de um lado e “25” do outro;
- Sitagliptina 50 mg – comprimido revestido, rosa, circular, biconvexo, com a inscrição “SN” de um lado e “50” do outro;
- Sitagliptina 100 mg – comprimido revestido, marrom, circular, biconvexo, com a inscrição “SN” de um lado e “100” do outro.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## 6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

### Dosagem

Tome sitagliptina exatamente como seu médico prescreveu. A dose recomendada deve ser tomada da seguinte maneira:

- 1 comprimido de 100 mg,
- uma vez ao dia,
- por via oral, com ou sem alimentos.

Seu médico poderá lhe receitar uma dose mais baixa, caso você apresente problemas renais.

### Como usar

Seu médico poderá lhe prescrever sitagliptina associado a alguns outros medicamentos que reduzem os níveis de açúcar no sangue.

A dieta e a prática de exercícios podem ajudar o seu organismo a utilizar melhor o açúcar existente no sangue. É importante que você mantenha a dieta recomendada pelo seu médico, os exercícios e o programa de perda de peso enquanto estiver tomando sitagliptina.

Continue a tomar sitagliptina pelo tempo prescrito pelo seu médico. Assim, você continuará a controlar os níveis de açúcar no sangue.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

**Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.**

## 7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Se esquecer uma dose, tome-a assim que lembrar. Caso não se lembre até o horário da próxima dose, pule a dose esquecida e continue tomando a dose usual. Não tome uma dose em dobro de sitagliptina.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

## 8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Como todos os medicamentos, sitagliptina pode causar reações adversas, embora nem todos os pacientes são afetados por elas.

Pare de tomar sitagliptina e procure um médico imediatamente se notar as seguintes reações adversas graves:

- Dor severa e persistente no abdômen (região do estômago) que possa atingir suas costas com ou sem náusea e vômito, uma vez que estes podem ser sinais de inflamação no pâncreas (pancreatite).

Se você tiver uma reação alérgica grave (frequência desconhecida), incluindo erupção cutânea, urticária, bolhas na pele / descamação da pele e inchaço do rosto, lábios, língua e garganta que possam causar dificuldade em respirar ou engolir, pare de tomar SITAGLIPTINA e procure seu médico imediatamente. Seu médico poderá prescrever um medicamento para tratar sua reação alérgica e um medicamento diferente para seu diabetes.

Os seguintes termos são usados para descrever a frequência com que as reações adversas foram relatadas:

- Reação muito comum (ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)
- Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento)
- Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento)
- Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento)
- Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes usando este medicamento)

Alguns pacientes apresentaram as seguintes reações adversas após acrescentar sitagliptina ao tratamento com metformina:

Comuns: baixos níveis de açúcar no sangue, náuseas, flatulência, vômitos.

Incomuns: dor de estômago, diarreia, constipação, sonolência.

Alguns pacientes apresentaram diferentes tipos de desconforto estomacal quando iniciaram a combinação de sitagliptina e metformina ao mesmo tempo (frequência é comum).

Alguns pacientes apresentaram as seguintes reações adversas quando usaram sitagliptina em combinação com uma sulfonilureia e metformina:

Muito comum: baixos níveis de açúcar no sangue.

Comum: constipação.

Alguns pacientes apresentaram as seguintes reações adversas quando usaram sitagliptina e pioglitazona:

Comuns: flatulência, inchaço das mãos ou pernas.

Alguns pacientes apresentaram as seguintes reações adversas quando usaram sitagliptina em combinação com pioglitazona e metformina:

Comuns: inchaço das mãos ou pernas.

Alguns pacientes apresentaram as seguintes reações adversas quando usaram sitagliptina em combinação com insulina (com ou sem metformina):

Comuns: resfriado.

Incomuns: boca seca.

Alguns pacientes apresentaram as seguintes reações adversas quando usaram sitagliptina isoladamente em estudos clínicos, ou após a aprovação com o uso isolado e/ou com outros medicamentos para diabetes:

Comuns: baixos níveis de açúcar no sangue, dor de cabeça, infecção do trato respiratório superior, nariz entupido ou escorrendo e dor de garganta, osteoartrite, dor no braço ou perna.

Incomuns: tontura, constipação, coceira.

Raros: número reduzido de plaquetas.

Frequência desconhecida: problemas renais (algumas vezes com necessidade de diálise), vômitos, dor nas articulações, dores musculares, dor nas costas, doença pulmonar intersticial, penfigoide bolhoso (um tipo de bolha na pele).

Informe ao seu médico se apresentar qualquer efeito adverso incomum ou se algum efeito adverso conhecido não desaparecer ou piorar.

Seu médico poderá lhe dar informações mais detalhadas sobre sitagliptina e diabetes.

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

## **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTES MEDICAMENTOS?**

Se você tomar mais do que a dose prescrita de sitagliptina, entre em contato com seu médico imediatamente.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.**

## **III) DIZERES LEGAIS**

### **VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

Registro: 1.0047. 0660

Farm. Resp.: Cláudia Larissa S. Montanher

CRF-PR nº 17.379

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 25/03/2024.**

Produzido por:

**Sandoz Private Limited**

Navi Mumbai – Índia

Registrado e Importado por:

**Sandoz do Brasil Indústria Farmacêutica Ltda.**

Rua Antônio Rasteiro Filho (Marginal PR 445), 1.920, Cambé-PR

CNPJ: 61.286.647/0001-16

**SANDOZ**

**Histórico de Alteração da Bula - Paciente**

| Dados da submissão eletrônica |                |                                                                     | Dados da petição/notificação que altera bula |                  |                                                                     |                   | Dados das alterações de bulas |                  |                            |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| Data do expediente            | No. expediente | Assunto                                                             | Data do expediente                           | Nº do expediente | Assunto                                                             | Data de aprovação | Itens de bula                 | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas |
| 06/12/2024                    | -              | Inclusão Inicial de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | 06/12/2024                                   | -                | Inclusão Inicial de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12 | 06/12/2024        | Versão Inicial                | VP 01            | 25 mg<br>50mg<br>100mg     |