

Bula para o paciente

Acnase Gel

Peróxido de Benzoíla 5%

Gel. Uso Tópico. Apresentação: bisnaga com 20 g.

Uso adulto e em pacientes acima de 12 anos.

Cada g de gel contém:

Peróxido de Benzoíla	50 mg
Propilenoglicol, associação de álcoois graxos e emulsificantes não iônicos, coco glicerídeo, éster cáprico caprílico, isononanoato de cetosteárla, sclerotium gum, goma xantana, metilparabeno, propilparabeno, hidróxido de sódio, simethicone emulsão e água purificada q.s.p.	1 g

Informações ao paciente

Ação do medicamento: **Acnase Gel** atua no tratamento tópico da acne vulgar. Seu mecanismo de ação se deve ao poder bactericida e redutor da oleosidade da pele conferido pelo peróxido de benzoíla.

Indicação do medicamento: **Acnase Gel** é indicado para o tratamento tópico da acne vulgar.

Riscos do Medicamento: **Acnase Gel** é contra indicado para pessoas hipersensíveis ao peróxido de benzoíla e demais componentes da formulação e em crianças com menos de 12 anos de idade.

“ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A GRAVIDEZ SEM ORIENTAÇÃO MÉDICA OU DO CIRURGIÃO-DENTISTA.”

“INFORME SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO.”

“INFORME AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.”

Precauções e advertências: **Acnase Gel** é um medicamento somente para uso externo; evite o contato com a mucosa da boca, olhos, pálpebras e outras mucosas, em feridas ou na pele irritada. Se eventualmente isto ocorrer, lave com água em abundância. Este produto pode manchar cabelos e tecidos coloridos, lave as mãos após a aplicação. Devido à possibilidade de hiperpigmentação e para que não haja uma irritação cumulativa, durante o tratamento evite a exposição ao sol da área onde o medicamento foi aplicado.

Interações medicamentosas: O uso concomitante de outras preparações tópicas para o tratamento da acne, especialmente abrasivos ou descamantes, pode levar a uma irritação cutânea cumulativa e, por isso, deve ser feito com orientação médica.

“INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.” “INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM OUTRO MEDICAMENTO.”

Modo de uso:

Aspecto físico: verifique se o medicamento que você comprou possui as seguintes características: gel branco com odor característico.

“ANTES DE USAR OBSERVE O ASPECTO DO MEDICAMENTO.”

Cuidados de Administração: É importante efetuar o teste de adaptação e, só após este período, seguir a posologia indicada. Após os primeiros dias de aplicação, a pele começará a descamar como se tivesse sido queimada pelo sol, podendo ocorrer ardor, ressecamento e vermelhidão que, se moderados, são normais e desejáveis. **Acnase Gel** deve ser aplicado com a ponta dos dedos espalhando cuidadosamente, sem esfregar. Evite usar quantidades exageradas.

Teste de Adaptação:

Primeiro passo: durante 4 dias, antes da aplicação lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente duas horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Havendo boa tolerância, seguir o segundo passo.

Segundo passo: durante 4 dias, antes da aplicação lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** na área afetada, deixe o produto em contato com a pele somente quatro horas por dia. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Não ocorrendo desconforto ou intolerância durante esses quatro dias, seguir o terceiro passo.

Terceiro passo: durante 4 dias, antes da aplicação lave o rosto com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** na área afetada na hora de deitar e deixe durante a noite. Remova em seguida com água e sabonete neutro. Após o término da fase de adaptação, utilize o produto normalmente conforme posologia.

Posologia: Antes de cada aplicação, lave o local com água e sabonete neutro. Aplique **Acnase Gel** uma a duas vezes ao dia, de manhã e à noite, desde que a área tratada não seja exposta ao sol. Evite o sol intenso, mas se houver necessidade de exposição moderada ao sol, **Acnase Gel** não deve ser usado durante o dia. Neste caso, após a limpeza da área em tratamento, deve-se aplicar um bloqueador solar não alcoólico, dando preferência aos produtos não comedogênicos.

A melhora significativa na redução dos cravos e espinhas costuma ser observada a partir da 4ª semana, mas o tratamento da acne geralmente leva de 12 a 20 semanas.

“SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR. NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS, PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.”

Reações Adversas: Em pessoas hipersensíveis, e sensíveis ao peróxido de benzofila (cerca de 2%), pode haver reação do tipo alérgica ou irritativa da pele, incluindo vermelhidão, dor, queimação e coceira exagerada, inflamação, formação de bolhas e crostas ou inchaço no local, ressecamento e descamação. Interrompa o uso do medicamento. Compressas frias no local podem produzir alívio da irritação e o uso de substâncias emolientes e / ou corticosteróides podem ser indicados pelo médico.

Conduta em caso de superdosagem: Em caso de superdosagem, suspenda o uso do produto por alguns dias e a pele voltará ao normal. Para aliviar os sintomas, realize compressas frias no local. Após o desaparecimento dos sinais e sintomas, se a reação for devido ao uso excessivo e não à alergenidade, deve-se reduzir a frequência de uso do produto.

Cuidados de conservação: O medicamento deve ser mantido bem fechado e armazenado à temperatura ambiente (15 a 30° C). Prazo de Validade: 24 meses. Vide bisnaga e cartucho. **ATENÇÃO:** não utilize o produto fora do prazo indicado, pois o efeito esperado poderá não ocorrer.

Pacientes idosos: Não existem recomendações específicas para pacientes idosos.

“TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.”

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA RDC ANVISA 199/2006. AFE N°1.00174-0

Farm. Resp. Daniela Ziolkowski – CRF-SP nº 29 486

ZURITA Laboratório Farmacêutico Ltda

Rua Domingos Graziano, 104 – Araras – SP

CEP: 13.600-718

CNPJ nº 44.211.936/0001-37 – Indústria Brasileira

Atendimento ao Consumidor 0800 -17-2119

www.zurita.com.br