

Texto de rotulagem

Gastrobem

Hidróxido alumínio 37 mg/mL

Hidróxido de magnésio 40 mg/mL

Simeticona 5mg/mL

ANTIÁCIDO + ANTIGASES

AZIA, MÁ DIGESTÃO, ACIDEZ E ESTOMACAL E GASES

AGITE ANTES DE USAR

Uso oral

SUSPENSÃO ORAL

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Contém 240 mL

COMPOSIÇÃO

Cada mL da suspensão contém: hidróxido de alumínio 37 mg, hidróxido de magnésio 40 mg, simeticona 5 mg e excipiente q.s.p. Excipientes: sorbitol, sacarina sódica, aroma de menta, goma xantana, hipoclorito de sódio e água purificada.

INDICAÇÃO : Tratamento dos sintomas da acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, dor de estômago, dispepsia (indigestão), queimação, esofagite péptica (inflamação do esôfago, causada pelo refluxo gástrico) e hérnia de hiato. Também é utilizado como antiflatulento (antigases) para alívio dos sintomas do excesso de gases, inclusive nos quadros pós-operatórios.

POSOLOGIA: Uso pediátrico: tomar 1 colher de chá (5 mL), 1 a 2 vezes ao dia. Uso adulto: tomar 1 a 2 colheres (10 mL a 20 mL), 4 vezes ao dia.

ADVERTÊNCIA: Este medicamento não deve ser utilizado nos casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula, insuficiência renal severa, hipofosfatemia (pouco fósforo no sangue) , gravidez, amamentação e obstrução intestinal. Este medicamento é contraindicado para uso por pacientes com insuficiência renal severa. Esse medicamento pode reduzir a absorção de outros medicamentos. Por esse motivo, deve se administrado 2 horas antes ou depois do uso desses medicamentos.

PRECAUÇÕES: A administração deve ser realizada com cautela: em pacientes com porfiria que estejam fazendo hemodiálise; na vigência de dietas pobres em fósforo. Não é aconselhável ultrapassar as doses recomendadas ou prolongar o tratamento por mais de 14 dias (com a dose máxima). O uso prolongado de

Texto de rotulagem

antiácidos contendo alumínio por pacientes normofosfatêmicos pode resultar em hipofosfatemia. Em pacientes com insuficiência renal, administração desse medicamento deve ser realizada sob supervisão médica.

Para correta utilização deste medicamento, solicite orientação do farmacêutico.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30°C). Proteger da luz e da umidade.

MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC nº576/2021.

Natulab Laboratório S. A.

Rua José Rocha Galvão Nº 02, Galpão III - Salgadeira

Santo Antônio de Jesus - BA - CEP 44.444-312

CNPJ 02.456.955/0001-83

Responsável Técnico: Olavo Souza Rodrigues

CRF/BA 4826

Indústria Brasileira

Logo com assinatura do SAC

0800 730 7370

www.natulab.com.br

Cód. de barras: 7899470807744

Raspe aqui com um objeto de metal