

glicinato de magnésio +
cloridrato de piridoxina

APRESENTAÇÕES

Comprimidos revestidos em embalagens com 10, 30 e 60 comprimidos.

VIA ORAL
USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 10 ANOS

COMPOSIÇÃO

Cada comprimido revestido contém: (*)
glicinato de magnésio
(equivalente a 130,0 mg (18%)
de magnésio elementar).....722,2 mg.....100%
cloridrato de piridoxina

(Vitamina B₆).....1,0 mg.....154%
Excipientes q.s.p. 1 comprimido: celulose microcristalina,
copovidona, croscarmellose sódica, dióxido de silício,
beenato de glicerila, povidona, macrogol, talco, álcool
polivinílico, dióxido de titânio e óxido de ferro amarelo.

**(*) Teor percentual do componente na posologia
máxima relativo à Ingestão Diária Recomendada
para Adultos.**

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

**1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO FOI
INDICADO?**

Magnen B6® é destinado à suplementação vitamínico-
mineral nos casos de dietas restritivas e inadequadas;
como auxiliar do sistema imunológico; em doenças
crônicas ou convalescença e para idosos.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Magnen B6® atua como suplemento vitamínico-
mineral. Quando ingerido regularmente supre prováveis

deficiências da dieta diária, auxilia o sistema imunológico,
em casos de doenças crônicas ou convalescença, e também
os idosos.

**3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE
MEDICAMENTO?**

Magnen B6® é contraindicado para pacientes que
apresentam hipersensibilidade a qualquer um dos
componentes da fórmula; para pacientes com Parkinson;
em uso de levodopa isolada e em casos de insuficiência
renal grave.

**Este medicamento é contraindicado para menores
de 10 anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-
dentista.**

**4. O QUE DEVO SABER ANTES DE UTILIZAR
ESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de hipersensibilidade ao produto, recomenda-se
descontinuar o uso.

Não ingerir doses maiores que as recomendadas.
Você deve usar com cautela o medicamento se apresentar
alterações do ritmo do músculo cardíaco e insuficiência
renal leve ou moderada. Magnen B6® não deve ser
usado por períodos prolongados em doses superiores às
recomendadas.

Não há restrições específicas para o uso de Magnen B6®
em idosos e grupos especiais, desde que observadas as
contraindicações e advertências comuns ao medicamento.

**Este medicamento é contraindicado para menores
de 10 anos.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres
grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-
dentista.**

Interações Magnen B6® - medicamentos

A administração concomitante de Magnen B6® pode
prejudicar ou potencializar os seguintes tratamentos:
levodopa isolada, glimepirida, anticoagulantes orais,
bisfosfonatos, cetoconazol, cimetidina, ranitidina,
clordiazepóxido, demeclociclina, diazepam, digitálicos,
fluoroquinolonas, salicilatos, moxifloxacino,
dexametasona, prednisona e tetraciclina, anfetaminas,
efedrina, levodopa, quinidina, amicacina, dibecacina e
cisatracúrio.

A administração com esteroides anabólicos ou
anabolizantes pode aumentar o risco de edema.

A ingestão de Magnen B6® não altera a absorção de
eterocoxibe.

A farmacocinética (absorção, distribuição, metabolização
e excreção) dos componentes de Magnen B6® pode ser
alterada quando houver administração concomitante
com: agonistas beta-2, aminoglicosídeos, amifostina,
cicloserina, contraceptivos orais, estrógenos, insulina,
isoniazida, penicilamina.

A ingestão crônica de álcool pode prejudicar a
metabolização de magnésio pelos rins.

Interações Magnen B6® – substâncias químicas

A ingestão crônica de álcool pode prejudicar a
metabolização do magnésio pelos rins.

Interações Magnen B6® – exames laboratoriais

A ingestão de Vitamina B₆ pode provocar uma reação
falso-positiva na detecção de urobilinogênio quando
utilizado o Reativo de *Ehrlich*.

Interações Magnen B6® – doenças

Nos casos de insuficiência renal severa Magnen B6® está
contraindicado.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você
está fazendo uso de algum outro medicamento.**

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve conservar Magnen B6® em temperatura ambiente (temperatura entre 15°C e 30° C). Proteger da luz e umidade.

Este medicamento tem validade de 24 meses a partir da data de sua fabricação.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Magnen B6® apresenta-se sob a forma de comprimidos revestidos oblongos de coloração amarela.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve tomar os comprimidos com líquido, por via oral. Posologia: ingerir dois comprimidos revestidos de Magnen B6® por dia, em uma ou duas tomadas ou a critério do médico, com pequena quantidade de líquido, após as refeições.

Utilizar apenas a via oral. O uso deste medicamento por outra via, que não a oral, pode causar a perda do efeito esperado ou mesmo promover danos ao seu usuário.

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.

Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure

orientação de seu médico ou cirurgião-dentista.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você pode tomar a dose deste medicamento assim que se lembrar. Não exceda a dose recomendada para cada dia. **Em casos de dúvidas, procure orientação do farmacêutico, ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.**

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Distúrbios Gastrointestinais: náusea (enjoo), vômito; dor abdominal; irritação gastrointestinal e diarreia.

Distúrbios Cutâneos: reações alérgicas e rubor (vermelhidão).

Distúrbios Endócrinos: perda de apetite.

Distúrbios do Sistema Nervoso: cefaleia (dor de cabeça); sonolência e neuropatia sensorial (doença que afeta os nervos que levam informações das sensações das várias partes do corpo para o cérebro).

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.

Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Se você tomar uma dose muito grande deste medicamento podem ocorrer:

Distúrbios Cardiovasculares e Respiratórios: hipotensão (pressão arterial anormalmente baixa); alterações do ritmo cardíaco (como assistolia – parada dos batimentos cardíacos – e bradicardia – lentidão excessiva na ação do coração); depressão respiratória (diminuição do ritmo e intensidade da respiração) e insuficiência respiratória.

Distúrbios Endócrinos: sede.

Distúrbios Gastrointestinais: dor abdominal; náusea

(enjoo) e vômito.

Distúrbios Musculares: fraqueza muscular e paralisia muscular.

Distúrbios do Sistema Nervoso: confusão; perda de reflexos; depressão do sistema nervoso central; coma; cefaleia (dor de cabeça) e tontura.

Outros: insuficiência renal.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

DIZERES LEGAIS

Reg. M.S. nº: 1.0155.0241

Farmacêutica Responsável: Regina Helena Vieira de Souza Marques • CRF-SP 6.394

Embalado por: Droxter Indústria, Comércio e Participações Ltda.

Rua Vigário Taques Bittencourt, 258 • Santo Amaro São Paulo/SP • CEP 04755-060

Registrado por: Marjan Indústria e Comércio Ltda.

Rua Gibraltar, 165 • Santo Amaro

São Paulo/SP • CEP 04755-070

CNPJ nº 60.726.692/0001-81

Indústria Brasileira

SAC 0800 55 45 45

Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas procure orientação médica.

Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 27/08/2019.



APROVAÇÃO
Barra Code 6
Legenda de Cores BLACK
Dimensões 270 x 180 mm